

ゼローダ用量チェック表

医療者用（保険調剤薬局）


【効能・効果】

- 切除不能または再発乳癌：A 法または B 法、タイケルブ併用の場合：C 法
- 結腸がんにおける術後補助化学療法：B 法
- 治癒切除不能な進行再発の結腸・直腸がん：他の抗がん剤との併用で C 法
- 胃がん：白金製剤との併用で C 法
- 直腸癌：放射線併用で D 法

【用法・用量】

	用量 (mg/m ² /日)	内服期間 (日)	休薬期間 (日)	1コース (日)	併用	癌腫
A 法	1650	21	7	28	なし	乳癌
B 法	2500	14	7	21	なし	乳癌 結腸癌
C 法	2000	14	7	21	あり 注射	結腸・直腸癌※ ¹ 胃癌 乳癌※ ²
D 法	1650	5	2	7	あり 放射線	直腸癌

※1)イリノテカンと併用の場合 1600 mg/m²/日、 ※2)タイケルブと併用



併用禁忌：S-1（投与中および投与中止後7日以内）

併用注意：ワルファリン、フェニトイン、トリフルリジン・チピラシル

【腎機能・肝機能】

	基準	用量
腎機能	Ccr51 以上	減量不要
	Ccr30-50	1段階減量(75%dose)
	Ccr30 未満	投与禁忌
肝機能	軽度、中等度	100%