

S1 チェック表

(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)

医療者用 (保険調剤薬局)

【効能・効果】

- 胃癌
- 結腸・直腸癌：再発・進行
- 頭頸部癌
- 非小細胞肺癌
- 手術不能または再発乳癌
- 手術不能または再発膵癌

【用法・用量】

内服期間 (日)	休薬期間 (日)	1 コース (日)	併 用	癌 腫
28	14	42	なし	適応症があるすべての癌腫
21	14	35	あり 注射	胃癌 肺癌
14	14	28		結腸・直腸癌
14	7	21		結腸・直腸癌 胃癌 膵癌 肺癌

体表面積	1 回用量 (日)
1.25 m ² 未満	80mg
1.25~1.5 m ²	100mg
1.5 m ² 以上	120mg

※増量する場合、初回基準量から1段階までとし
150mg/日を限度とする。

【併用禁忌・相互作用】

- 併用禁忌：下記の薬剤がある場合には、最低7日間休薬していることを確認
フッ化ピリミジン系抗悪性腫瘍剤（フルオロウラシル、テガフル・ウラシル配合剤、テガフル、ドキシフルリジン、カペシタビン、ホリナート・テガフル・ウラシル療法）
フッ化ピリミジン系抗真菌薬（フルシトシン）
- 併用注意：
フェニトイン、ワルファリン、トリフルリジン・チピラシル

【腎機能・肝機能】

	基準	用量
腎機能	Ccr80 以上	減量不要
	60 ≤ CCr < 80	必要に応じて1段階減量
	40 ≤ CCr < 60	原則として1段階減量
	30 ≤ CCr < 40	原則として2段階減量
	Ccr30 未満	投与禁忌
肝機能	軽度、中等度	慎重投与